

Ziektecriteria voor de diagnose SLE (1982)

1. Vlindervormig erytheem

Vlindervormige roodheid op neusrug en wangen. Kan ook éézijdig zijn.

2. Discoïde lupus

verheven rode plekken op de huid, soms schilferend, eventueel gepaard gaande met littekenvorming. Kunnen overal op het lichaam aanwezig zijn.

3. Zonlichtovergevoeligheid

Ongebruikelijke uitslag van de zonbeschenen huid en eventueel weer actief worden dan wel verergeren van de SLE.

4. Zweertjes

In de mond-keel-neus holte. Meestal niet pijnlijk.

5. Gewrichten

Ontstekingen in twee of meer perifere gewrichten, gekenmerkt door pijn, zwelling, of vocht in het gewricht.

6. Pleuritis of pericarditis

Ontsteking van het borstvlies of van het hartzakje

7. Nierafwijkingen

Eiwit in de urine, meer dan een ½ gram per dag, celcilinders inde urine

8. Stoornissen van het zenuwstelsel

Toevallen of psychosen; hierbij kunnen toevallen ontstaan of vervreemding van jezelf. Vooral dit laatste is moeilijk duidelijk te maken aan de buitenwereld.

9. Stoornissen in het bloedsysteem

Hemolytische anemie; bloedarmoede tgv afbraak van rode bloedcellen

Leukopenie; tekort aan witte bloedlichaampjes

Trombocytopenie: tekort aan bloedplaatjes

10. Abnormale antistoffen in het bloed (zgn: LE antistoffen) met name tegen speciale bestanddelen van celkernen, bijv. DNA, Sm, SS-A, SS-B, positieve LE celtest of vals positieve lues reacties.

11. Antistoffen tegen kernen van cellen (zogenaamde ANA, met een titer van > 1:160)

De ziektecriteria hebben een sensitiviteit van 93% en een specificiteit van 90%.

Diagnose SLE : 4 of meer van de 11 criteria

Bij niet voldoen aan de criteria is SLE echter niet uitgesloten