## Tabel : Huidlymfomen, 5 jaarsoverleving

| Aandoening | 5-jaars-overleving (%) |
|---|---|
| **T-CELLYMFOMEN** | |
| **Milde variant** | |
| Mycosis fungoides | 88 |
| Folliculotrope mycosis fungoides | 80 |
| Pagetoïde reticulose | 100 |
| Granulomateus slappe huid type mycosis fungoides | 100 |
| Primair cutane CD30+ lymfoproliferatieve aandoeningen:<br>- Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom | 95 |
| - Lymfomatoïde papulose | 100 |
| Subcutaan panniculitis-achtig T-cellymfoom | 82 |
| Primair cutaan CD4+ klein/middelgroot pleomorf T-cellymfoom | 75 |
| **Agressieve variant:** | |
| Sézary syndroom | 24 |
| Volwassen T-cel leukemie/lymfoom | Onbekend |
| Extra-nodaal NK/T-cellymfoom, nasale type | Onbekend |
| Primair cutaan perifeer T-cellymfoom, niet nader gedefinieerd | 16 |
| - Primair cutaan agressief epidermotroop CD8+ T-cellymfoom | 18 |
| - Cutaan γ/δ T-cellymfoom | Onbekend |
| **B-CELLYMFOMEN** | |
| Primair cutaan marginale zone B-cellymfoom | 99 |
| Primair cutaan follikelcentrum lymfoom | 95 |
| Primair cutaan diffuus grootcellig B-cellymfoom van de benen | 55 |
| Primair cutaan diffuus grootcellig B-cellymfoom, overig | 50 |

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 1905 Nederlandse en Oostenrijkse patiënten. Het percentage geeft weer hoeveel patiënten na 5 jaar niet zijn overleden aan de gevolgen van het huidlymfoom en dus de diagnose huidlymfoom hebben overleefd

© Huidarts.com 2016